



"전염성 결핵환자의 밀접접촉자
100명 중 약 30명(30%)이
결핵균에 감염되고,
그 중 3명(10%)이 결핵으로
발병할 수 있습니다."

2주 이상 기침하면
결핵검사를 받으세요.



결핵과 잠복결핵 바로알기

결핵

2주 이상 기침,
발열, 체중감소 등

..... 증상 유무

기침, 대화를 통해
공기 중으로 전파

..... 전염성 유무

결핵 환자로
반드시 치료

..... 환자 여부

법적 의무로
신고해야 함

..... 신고 의무

잠복결핵

전혀 없음

전혀 없음

환자 아님

해당 없음



결핵/잠복결핵 치료는 보건소·민간에서 모두 무료로 받으실 수 있습니다.

결핵 퇴치를 위해서는 **잠복결핵**을 찾아서 치료해야 합니다.



▲ 잠복결핵 치료 중 부작용 잘 알고 대처하기

· 치료 중 발생 가능한 부작용으로는
간독성, 신독성, 피부발진, 두통,
어지러움, 저혈압, 위장장애 등이 있습니다.

· 약 복용 후 부작용 또는 부작용이 의심되는
증상이 나타나면, 즉시 담당의사에게 진료를 받아
복약 중단 등 적절한 조치를 받는 것이 중요합니다.



올해부터 의료기관, 어린이집 등의 집단시설 종사자와
만 40세 생애전환기 건강진단 대상자 등
약 180만 명에게 **잠복결핵 검진**을 실시합니다.

※ 잠복결핵 감염자에 대하여 '업무 중사 일시 제한, 취업 거부' 등 사회격리 규제가 불필요



"잠복결핵 감염자는
면역력이 약해지면
결핵으로 발병할 수 있어
검진과 치료로 결핵 발병을
예방하는 것이 중요합니다."
(잠복결핵치료를 통해 결핵 발병을
60~90% 예방할 수 있음)



잠복결핵 문의, 치료기관 안내 등

질병관리본부 콜센터 ☎1339 및 가까운 보건소

• 생활 속 결핵예방 수칙 •

2주이상 기침하면 결핵검사

올바른 기침예절 실천



기침할 땐
휴지로 입과 코를
가리고 하기



휴지가 없을 때는
옷소매 위쪽으로
입과 코를 가리고 하기



기침을 한 후에는
흐르는 물에
30초 이상 손 씻기

"결핵예방을 위해 기침예절을 지켜주세요"

발행년월: 2017.03.

질병관리본부 에이즈·결핵관리과

결핵ZERO 홈페이지 | <http://tbzero.cdc.go.kr>

잠복
결핵

LATENT
TUBERCULOSIS



결핵

TUBERCULOSIS